

**REGLAMENTO (CEE) N° 1577/86 DEL CONSEJO**

de 23 de mayo de 1986

**por el que se fijan, para la cosecha de 1986, los precios de objetivo, los precios de intervención y las primas concedidas a los compradores de tabaco en hoja, los precios de intervención derivados del tabaco embalado, así como las calidades de referencia y las zonas de producción**

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 43,

Vista el Acta de adhesión de España y de Portugal y, en particular, el apartado 1 de su artículo 89 y el apartado 2 de su artículo 234,

Visto el Reglamento (CEE) n° 727/70 del Consejo, de 21 de abril de 1970, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del tabaco crudo <sup>(1)</sup>, modificado en último lugar por el Reglamento (CEE) n° 1576/86 <sup>(2)</sup>, y, en particular, el apartado 5 de su artículo 2, el apartado 4 de su artículo 4 y el apartado 8 de su artículo 6,

Vista la propuesta de la Comisión <sup>(3)</sup>,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo <sup>(4)</sup>,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social <sup>(5)</sup>,

Visto el dictamen del Comité Monetario,

Considerando que, al fijar los precios en el sector del tabaco bruto procede tener en cuenta tanto los objetivos de la política agrícola común como la aportación que la Comunidad pretende realizar al desarrollo armonioso del comercio mundial; que la política agrícola común tiene por objetivos, en particular, garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, garantizar la seguridad de los abastecimientos y asegurar al consumidor suministros a precios razonables;

Considerando que los precios de objetivo y los precios de intervención del tabaco en hoja deben fijarse en función de los criterios contemplados en el apartado 2 del artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 727/70 para estimular la orientación de la producción, en particular en el sentido de una conversión de los cultivos hacia las variedades más solicitadas y competitivas;

Considerando que es oportuno fijar asimismo, para la cosecha 1986, precios de intervención derivados para las variedades que, antes de la entrada en vigor de la organización común de mercados o, respecto de las variedades cultivadas en Grecia, en España y en Portugal, antes de la adhesión, se beneficiaban de una garantía de precios en la fase de tabaco embalado, así como

para las variedades principalmente culturales en Alemania, a fin de tener en cuenta las vías de comercialización existentes en dicho país;

Considerando que la prima concedida a los compradores de tabaco comunitario está destinada a que puedan pagar a los productores de tabaco en hoja un precio que se sitúe al nivel del precio de objetivo teniendo en cuenta la evolución de los precios del mercado mundial, así como el nivel de los precios resultante del juego de la oferta y la demanda en el mercado comunitario;

Considerando que los precios contemplados así como el importe de la prima deben fijarse para cada variedad producida en zonas de producción reconocidas y con relación a una calidad de referencia definida de forma que permitan una evaluación lo más objetiva posible de la calidad del tabaco;

Considerando que, para la cosecha 1986, es conveniente indicar las zonas de producción reconocidas de cada variedad de tabaco y mantener las definiciones de las calidades de referencia establecidas por el Reglamento (CEE) n° 1505/85 del Consejo, de 23 de mayo de 1985, por el que se fijan, para la cosecha de 1985, los precios de objetivo, los precios de intervención y las primas concedidas a los compradores de tabaco en hoja, los precios de intervención derivados del tabaco embalado, así como las calidades de referencia <sup>(6)</sup>; que estas indicaciones, tanto las de las zonas de producción reconocidas como las de las calidades de referencia, deben mencionarse asimismo para las variedades españolas y portuguesas;

Considerando que la reglamentación actual señala que la variedad Kentucky, cuando adopta la forma de tabaco embalado, debe presentarse en barricas de 280 a 450 kg aproximadamente o en fardos de 170 a 200 kg aproximadamente; que procede mantener la presentación en barricas y en fardos, pero asimismo prever, como para otras variedades italianas, una presentación en forma de cajas de cartón de 150 a 200 kg;

Considerando que, con arreglo a las disposiciones del apartado 1 del artículo 103 y del artículo 296 del Acta de adhesión de España y de Portugal, los precios de intervención que deberán aplicarse en España y en Portugal se fijarán en un nivel que permita a los productores de tabaco establecidos en cada uno de estos dos países obtener precios de mercado equivalentes a los obtenidos durante un período representativo del régimen nacional anterior pendiente de determinar; que resulta conveniente para la definición de dicho período, tomar en consideración las cosechas 1983, 1984 y 1985;

<sup>(1)</sup> DO n° L 94 de 28. 4. 1970, p. 1.

<sup>(2)</sup> Véase página 1 del presente Diario Oficial.

<sup>(3)</sup> DO n° C 85 de 14. 4. 1986, p. 40.

<sup>(4)</sup> DO n° C 120 de 20. 5. 1986.

<sup>(5)</sup> DO n° C 118 de 20. 5. 1986, p. 1.

<sup>(6)</sup> DO n° L 151 de 10. 6. 1985, p. 31.

Considerando que el Acta de adhesión de España y de Portugal señala en el apartado 2 de su artículo 103 y en su artículo 297 que los precios de objetivo relativos a los precios de intervención mencionados anteriormente se fijarán en España y Portugal, para la cosecha 1986, en un nivel que refleje la relación existente entre el precio de objetivo y el precio de intervención, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 2 del Reglamento (CEE) nº 727/70;

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

#### *Artículo 1*

Para la cosecha 1986, las calidades de referencia y las zonas de producción reconocidas para cada una de las variedades de tabaco en hoja de la producción comunitaria, contempladas en las letras b) y c) del apartado 3, del artículo 2 del Reglamento (CEE) nº 727/70, se fijan en los Anexos I y III respectivamente del presente Reglamento.

#### *Artículo 2*

Para la cosecha 1986, las calidades de referencia y las zonas de producción reconocidas contempladas en las letras b) y c) del apartado 3 del artículo 6 del Regla-

mento (CEE) nº 727/70, para cada una de las variedades de tabaco embalado de la producción comunitaria para las que se establezca un precio de intervención derivado, se fijan en los Anexos II y III respectivamente del presente Reglamento.

#### *Artículo 3*

1. Para la cosecha 1986, los precios de objetivo y de intervención y los importes de la prima concedida a los compradores de tabaco en hoja, contemplados en los artículos 2 y 3 del Reglamento (CEE) nº 727/70, así como los precios de intervención derivados del tabaco embalado contemplados en el artículo 6 del mencionado Reglamento, se fijan en el Anexo IV del presente Reglamento.

2. Los precios y primas se aplicarán siempre que cada una de estas variedades haya sido cultivada en las zonas de producción correspondientes indicadas en el Anexo III.

#### *Artículo 4*

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 23 de mayo de 1986.

*Por el Consejo*  
*El Presidente*  
G. BRAKS

## ANEXO I

## Tabaco en hoja: variedades y calidades de referencia del mismo para la cosecha de 1986

Número de orden	Variedad	Calidad de referencia
1	Badischer Geudertheimer y sus híbridos	<p>Hauptgut (Leaves) de clase 1</p> <p>Clase 1: hojas maduras, sanas, intactas de color marrón oscuro a moteado, de longitud uniforme</p> <p>Presentación: tabaco seleccionado, en manillas o en fardos provisionales, con ligaduras que no son tabaco</p> <p>Humedad: 26 %</p>
2	Badischer Burley E y sus híbridos	<p>Hauptgut (Leaves) de clase 1</p> <p>Clase 1: hojas maduras, sanas, intactas, carnosas, de color marrón rojizo a marrón claro, de longitud uniforme</p> <p>Presentación: tabaco seleccionado, en manillas o en fardos provisionales, con ligaduras que no son tabaco</p> <p>Humedad: 25 %</p>
3	Virgin D	<p>Hojas de clase 1</p> <p>Clase 1: hojas maduras, sanas, intactas, de color amarillo a rojo amarillo; se admiten, hasta un límite del tercio de la superficie de la hoja, diferencias tales como coloraciones parduzcas a amarillo verdoso</p> <p>Presentación: tabaco seleccionado, en manillas o en fardos provisionales, con ligaduras que no son tabaco</p> <p>Humedad: 19 %</p>
4	<p>a) Paraguay y sus híbridos</p> <p>b) Dragon vert y sus híbridos, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre</p>	<p>Hojas medianas (Leaves) de clase 2</p> <p>Clase 2: hojas sanas que presenten ligeros defectos de coloración, del tipo de tejido, de madurez, pero de combustibilidad satisfactoria</p> <p>Presentación: tabaco seleccionado y en manillas o en hojas sueltas</p> <p>Humedad: 27 %</p>
5	Nijkerk	<p>Hojas de corona (Tips) de clase 2</p> <p>Clase 2: — ya sea hojas de segunda longitud (inferior o igual a 45 cm), de tejido muy gomoso, carnoso, íntegro, resistente y elástico, con nervios poco pronunciados, de buena madurez, que se traduzca en una coloración marrón a marrón oscuro, de color vivo</p> <p>— ya sea hojas de primera longitud (superior a 45 cm) de tejido todavía más gomoso, carnoso, más íntegro, resistente, con nervios más o menos pronunciados, de todas las coloraciones, con exclusión del verde botella</p> <p>Presentación: tabaco seleccionado y en manillas o en hojas sueltas</p> <p>Humedad: 27 %</p>

Número de orden	Variedad	Calidad de referencia
6	a) Misionero y sus híbridos b) Río Grande y sus híbridos	Hojas de segunda calidad 2ª calidad: hojas desarrolladas, de más de 45 cm, de tejido no grueso, de coloración clara un poco amarillenta, de color vivo o bastante vivo, que tenga suficiente firmeza y sea bastante íntegro, de combustibilidad pasable Presentación: tabaco seleccionado y en manillas o en hojas sueltas Humedad: 27 %
7	Bright	Hojas de categoría A Categoría A: hojas de madurez suficiente, sin defectos de curado, de textura abierta, con nervios centrales y nervios no demasiado acentuados, sanas, de color amarillo en sus diferentes gradaciones Presentación: en fardos provisionales de 30 a 40 kg Humedad: 16 %
8	Burley I	Hojas de categoría A Categoría A: hojas de madurez suficiente, sin defectos de curado, de textura abierta, incluso consistentes, con los nervios centrales y nervios no demasiado acentuados, sanas, de color avellana más o menos vivo Presentación: en fardos provisionales de 30 a 40 kg o en manillas con ligaduras que no son tabaco (fascicoli) de 25 a 30 hojas Humedad: 19 %
9	Maryland	Hojas de categoría A Categoría A: hojas de madurez suficiente que presenten ligeros defectos de secado con muy pocas tonalidades color avellana, de tejido de textura mediana con los nervios centrales y los nervios no demasiado acentuados, sanas, de coloración marrón rojizo, más bien vivo Presentación: en fardos provisionales de 30 a 40 kg o en manillas con ligaduras que no son tabaco (fascicoli) de 25 a 30 hojas Humedad: 19 %
10	a) Kentucky y sus híbridos b) Moro di Cori c) Salento	Hojas de categoría B Categoría B: hojas de buena madurez, de tejido consistente, sin defectos de curado y de conservación, de color marrón, que presenten algunos defectos de integridad, de buena combustibilidad Presentación: en manillas con ligaduras que no son tabaco (fascicoli) de 25 a 30 hojas Humedad: 23 %

Número de orden	Variedad	Calidad de referencia
11	a) Forchheimer Havana II c b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano	Hojas de categoría B Categoría B: hojas de tejido consistente o ligero, sanas, sin defectos de curado, de color marrón verdoso, que presenten defectos de integridad Presentación: tabaco seleccionado, en manillas o en fardos provisionales con ligaduras que no son tabaco Humedad: 26 %
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio y variedades similares	Hojas de categoría B Categoría B: hojas de madurez suficiente de tejido consistente o incluso grueso o fino, que presenten defectos no acentuados de curado, de fermentación y de integridad Presentación: en manillas con ligaduras que no son tabaco (fascicoli) de 25 a 30 hojas Humedad: 24 %
13	Xanti-Yaká	Hojas de categoría B Categoría B: hojas suficientemente sanas y maduras, sésiles, de forma oval elíptica, con los nervios centrales poco acentuados y los nervios secundarios con un ángulo más bien abierto, que pueden presentar algunos defectos de curado, de tejido la mayoría de las veces ligero, de color que va del amarillo al marrón, con marcados defectos de integridad, pero bien conservadas, procedentes de todos los pisos foliares, de gusto discreto, de aroma suficiente y de buena combustibilidad La longitud de las hojas medianas no supera los 20 cm Presentación: en fardos provisionales de 15 a 20 kg o en cajas que contengan guirnaldas de hojas de 30 a 40 kg Humedad: 17 %
14	a) Perustitza b) Samsun	Hojas de categoría B Categoría B: hojas suficientemente sanas y maduras, sésiles (Perustitza) o pecioladas (Samsun) de forma elíptica lanceolada con la punta afilada (Perustitza) o elíptica redondeada (Samsun), con los nervios centrales poco acentuados y los nervios secundarios con un ángulo tendente al agudo, que pueden presentar algunos defectos de curado, de tejido la mayoría de las veces ligero, de color que va del amarillo al marrón (Perustitza) o tendente al parduzco (Samsun) con marcados defectos de integridad, pero bien conservadas, procedentes de todos los pisos foliados, de gusto discreto, de aroma suficiente y de buena combustibilidad La longitud de las hojas medianas no supera los 25 cm Presentación: en fardos provisionales de 15 a 20 kg o en cajas que contengan guirnaldas de hojas de 30 a 40 kg Humedad: 17 %

Número de orden	Variedad	Calidad de referencia						
15	Erzegovina y variedades similares	<p>Hojas de categoría B</p> <p>Categoría B: hojas suficientemente sanas y maduras, sésiles, de forma oval o elíptica con los nervios centrales medianamente acentuados y con los nervios secundarios en ángulo más bien abierto, que puede presentar algunos defectos de curado, de tejido la mayoría de las veces ligero, de color que va del amarillo al marrón, con marcados defectos de integridad, pero bien conservadas, procedentes de todos los pisos foliares, de gusto discreto, de aroma suficiente y de buena combustibilidad</p> <p>La longitud de las hojas medianas no supera los 35 cm</p> <p>Presentación: en fardos provisionales de 15 a 20 kg o en cajas que contengan guirnaldas de hojas de 30 a 40 kg</p> <p>Humedad: 17 %</p>						
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	<p>Hojas de categoría B</p> <p>Categoría B: hojas medianas inferiores seleccionadas por longitud de acuerdo con las proporciones siguientes:</p> <table data-bbox="890 904 1498 1010"> <tr> <td>1ª longitud (igual o superior a 38 cm)</td> <td>60 %</td> </tr> <tr> <td>2ª longitud (de 32 a menos de 38 cm)</td> <td>35 %</td> </tr> <tr> <td>3ª longitud (de 25 a menos de 32 cm)</td> <td>5 %</td> </tr> </table> <p>Hojas de dimensión conveniente, de buena madurez y de color uniforme, sanas, sin defectos de integridad, de textura fina, elástica y resistente, con los nervios centrales y los nervios poco pronunciados, de buena fermentación y bien conservadas, de buena combustibilidad, de gusto y aroma típicos, utilizables para el encapado de cigarrillos, que incluyan aproximadamente un 25 % de hojas no íntegras</p> <p>Presentación: en manillas con ligaduras que no son tabaco (fascicoli)</p> <p>Humedad: 22 %</p>	1ª longitud (igual o superior a 38 cm)	60 %	2ª longitud (de 32 a menos de 38 cm)	35 %	3ª longitud (de 25 a menos de 32 cm)	5 %
1ª longitud (igual o superior a 38 cm)	60 %							
2ª longitud (de 32 a menos de 38 cm)	35 %							
3ª longitud (de 25 a menos de 32 cm)	5 %							
17	Basma	<p>Hojas de la calidad I/III</p> <p>Calidad I/III: hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción del primero (protomana), que tengan hasta 15 cm de longitud, de color amarillo oro, anaranjado a rojo amarillo, de buena elasticidad y brillantes, bastante carnosas; estructura floja y buena textura; de aroma típico y acusado, de buena combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas constituirán el 45 % de la calidad I/III</p> <p>Hojas maduras, que presenten ligeros defectos de integridad y/o curado, algunas señales de enfermedad, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 20 cm de longitud, de color amarillo claro, verde claro, rojizo o marrón claro, de estructura bastante floja y de buena textura, de elasticidad media, moderadamente brillantes, moderadamente carnosas, de aroma típico y acusado, de muy buena combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas constituirán el 55 % de la calidad I/III</p> <p>Presentación: en fardos de 15 a 25 kg, presentados de la forma tradicional en dos filas de «pastali» (en hojas alineadas). (Es conveniente señalar que en los distritos de Astakós y Jrisúpoli la presentación se hace en armatodema)</p> <p>Humedad: 17 %</p>						

Número de orden	Variedad	Calidad de referencia
18	Katerini y variedades similares	<p>Hojas de la calidad I/III</p> <p>Calidad I/III: hojas maduras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción del primero (protomana), que tengan hasta 20 cm de longitud, de color amarillo claro o anaranjado a rojizo, de estructura floja, de buena elasticidad, brillantes, bastantes carnosas, de buena textura y muy buena combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas constituirán el 45 % de la calidad I/III</p> <p>Hojas maduras, que presenten ligeros defectos de integridad y/o curado, algunas señales de enfermedad, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 25 cm de longitud, de color amarillo, anaranjado, verde amarillo, rojizo o marrón claro, de estructura floja, moderadamente carnosas, de elasticidad media y brillantes, de buena textura y de muy buena combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas constituirán el 55 % de la calidad I/III</p> <p>Presentación: generalmente las guirnaldas se juntan de acuerdo con la forma de presentación «Baski» antes del embalaje. Presentación en fardos de 25 a 35 kg de acuerdo con la forma tradicional llamada «Kaloup»</p> <p>Humedad: 16 %</p>
19	a) Kaba Koulac clásico b) Ellassona	<p>Hojas de la calidad I/III</p> <p>Calidad I/III: hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción de las hojas de corona que tengan hasta 25 cm de longitud para Macedonia Kaba Koulac y hasta 20 cm de longitud para Ellassona, Karatzova y Kontoula, de color amarillo medio a oscuro, de buena elasticidad y brillantes, de estructura floja, de buena textura y de excelente combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas constituirán el 47 % de la calidad I/III</p> <p>Hojas maduras, que presenten ligeros defectos de integridad y/o curado, algunas señales de enfermedad, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 30 cm de longitud para Macedonia Kaba Koulac y 25 cm de longitud para Ellassona, Karatzova y Kontoula, de color amarillo, verde amarillo, rojizo, de estructura bastante floja y de bastante buena textura, de elasticidad media y moderadamente brillantes, de excelente combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas constituirán el 53 % de la calidad I/III</p> <p>Presentación: en fardos de 15 a 30 kg, presentadas de la forma tradicional en dos filas de armatodema</p> <p>Humedad: 17 %</p>
20	a) Kaba Koulac no clásico b) Myrodata Smyrne Trapezous y Phi I	<p>Hojas de la calidad I/III</p> <p>Calidad I/III: hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción de las hojas de corona, que tengan hasta 30 cm de longitud para Macedonia Kaba Koulac y Trapezous, hasta 20 cm para Phi I y hasta 15 cm para Myrodata Smyrne, de color amarillo claro a rojizo, de buena elasticidad y brillantes de estructura bastante floja de buena textura y excelente combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas constituirán el 47 % de la calidad I/III</p> <p>Hojas maduras y suficientemente íntegras, que presenten algunos defectos de curado, algunas señales de enfermedad, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 35 cm de longitud para Macedonia Kaba Koulac y Trapezous, hasta 25 cm para Phi I y hasta 20 cm para Myrodata, Smyrne, de color amarillo, verde</p>

Número de orden	Variedad	Calidad de referencia
20 (cont.)	a) Kaba Koulak no clásico b) Myrodata Smyrne Trapezous y Phi I	<p>amarillo o marrón claro, de textura bastante floja, de bastante buena textura, bastante elásticas y brillantes, de muy buena combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas constituirán el 53 % de la calidad I/III</p> <p>Presentación: en fardos de 25 a 35 kg, presentadas de la forma tradicional en armatodema, o de 35 a 50 kg en la forma de Kaloup</p> <p>Humedad: 17 %</p>
21	Myrodata Agrinion	<p>Hojas de la calidad I/III</p> <p>Calidad I/III: hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción del primero (protomana), que tengan hasta 25 cm de longitud, de color amarillo a anaranjado oscuro, de buena elasticidad y brillantes, de textura floja, de buena textura y de excelente combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas constituirán el 47 % de la calidad I/III</p> <p>Hojas maduras y suficientemente íntegras, que presenten ligeros defectos de secado, algunas señales de enfermedad, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 30 cm de longitud, de color amarillo, verde amarillo o rojizo claro, de estructura bastante floja y de bastante buena textura, bastante elásticas y brillantes, de excelente combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas constituirán el 53 % de la calidad I/III</p> <p>Presentación: en fardos de 15 a 30 kg presentadas de la forma tradicional en dos filas de armatodema</p> <p>Humedad: 15 %</p>
22	Zichnomyrodata	<p>Hojas de la calidad I/III</p> <p>Calidad I/III: hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción de las hojas de corona, que tengan hasta 20 cm de longitud, de color amarillo claro a anaranjado claro, de buena elasticidad y brillantes, de estructura floja, de buena textura y de excelente combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas constituirán el 47 % de la calidad I/III</p> <p>Hojas maduras y suficientemente íntegras, que presenten ligeros defectos de curado y algunas señales de enfermedad, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 25 cm de longitud, de color amarillo, verde amarillo o rojizo claro, de estructura bastante floja y de bastante buena textura, bastante elásticas y bastante brillantes, de excelente combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas constituirán el 53 % de la calidad I/III</p> <p>Presentación: en fardos de 15 a 30 kg presentadas de la forma tradicional en dos filas de armatodema</p> <p>Humedad: 17 %</p>
23	Tsebelia	<p>Hojas de la calidad I/III</p> <p>Calidad I/III: hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción del primero, que tengan hasta 35 cm de longitud, de color rojo amarillo, naranja a rojizo, de estructura floja, de buena elasticidad y brillantes, bastante carnosas, de buena textura y de muy buena combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas constituirán el 45 % de la calidad I/III</p>

Número de orden	Variedad	Calidad de referencia
23 (cont.)	Tsebelia	<p>Hojas maduras y suficientemente íntegras, que presenten ligeros defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 40 cm de longitud, de color amarillo claro, verde amarillo, rojizo o marrón claro, de estructura bastante floja, bastante elásticas y de brillo medio, bastante carnosas, de bastante buena textura y de muy buena combustibilidad. Esta categoría también comprende las hojas ligeramente desecadas y/o que presenten ligeros defectos de integridad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas constituirán el 55 % de la calidad I/III</p> <p>Presentación: en fardos de 30 a 40 kg, presentadas en dos filas de armatodema</p> <p>Humedad: 14 %</p>
24	Mavra	<p>Hojas de la calidad I/III</p> <p>Calidad I/III: hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con excepción del primero (protomana) que tengan hasta 30 cm de longitud, de un color que va de rojizo amarillo al naranja y al rojizo, de estructura floja, de buena textura, de buena elasticidad y brillantes, bastante carnosas y de buena combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas constituirán el 45 % de la calidad I/III</p> <p>Hojas maduras y suficientemente íntegras, que presenten ligeros defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 40 cm de longitud, de color amarillento, verde amarillo (limón), rojizo o marrón claro, de estructura bastante floja y de bastante buena textura, bastante elásticas y brillantes, bastante carnosas y de buena combustibilidad. Esta categoría también comprende las hojas ligeramente desecadas y/o que presenten ligeros defectos de integridad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas constituirán el 55 % de la calidad I/III</p> <p>Presentación: en fardos de 30 a 50 kg presentados en dos filas de armatodema</p> <p>Humedad: 14 %</p>
25	Burley GR	<p>Hojas de la calidad A</p> <p>Calidad A: hojas completamente maduras, completamente desarrolladas, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes del piso medio, de color uniforme marrón avellana medio a rojo avellana, de estructura floja, de buena textura y excelente combustibilidad</p> <p>Presentación: en fardos de 40 kg presentados en dos filas de armatodema sin bramante (hojas sueltas)</p> <p>Humedad: 22 %</p>
26	Virginia GR	<p>Hojas de la calidad A</p> <p>Calidad A: hojas completamente maduras, completamente desarrolladas, sanas, íntegras, sin defectos de curado, de color uniforme amarillo limón a naranja medio, carnosas, de buena textura y de buena combustibilidad, procedentes esencialmente del piso medio</p> <p>Presentación: en fardos de 30 a 40 kg, presentadas en dos filas de armatodema, sin bramante (hojas sueltas)</p> <p>Humedad: 19 %</p>

Número de orden	Variedad	Calidad de referencia
27	Santa Fe	<p>Hojas de clase 1</p> <p>Clase 1: hojas maduras, sanas, sin defectos de curado, con la vena central totalmente rendida, color marrón, con algunos defectos de integridad</p> <p>Presentación: tabaco seleccionado, en fardos provisionales homogéneos</p> <p>Humedad: 18 %</p>
28	Burley fermentado	<p>Hojas de clase 1</p> <p>Clase 1: hojas maduras, sanas, sin defectos de curado, con la vena central totalmente rendida, con buena combustibilidad, de color avellana a canela, con algunos defectos de integridad</p> <p>Presentación: tabaco seleccionado, en fardos provisionales homogéneos</p> <p>Humedad: 18 %</p>
29	Havana ESP	<p>Hojas de clase 1</p> <p>Clase 1: hojas maduras, sanas, tejido fino, con la vena central y las nervaduras poco acentuadas, sin defectos de curado, con la vena totalmente rendida, color marrón, marrón claro o verdoso, con algún defecto de integridad</p> <p>Presentación: tabaco seleccionado, en fardos provisionales uniformes</p> <p>Humedad: 18 %</p>
30	Round Scafati	<p>Hojas de clase 1</p> <p>Clase 1: hojas de dimensión suficiente, de buena madurez, de color uniforme, sanas, sin defectos de integridad, de tejido fino, elásticas y resistentes, con la vena central y las nervaduras finas, bien conservadas, de buena combustibilidad, de gusto y aroma típicos, aptas para cajas de cigarros. Se puede tolerar un porcentaje de hojas no íntegras del 25 % aproximadamente</p> <p>Presentación: en fardos homogéneos provisionales, conteniendo manojos atados con ligaduras que no son de tabaco</p> <p>Humedad: 18 %</p>
31	Virginia ESP	<p>Hojas de clase 1</p> <p>Clase 1: hojas de madurez suficiente, sin defectos de curado, de textura abierta, con la vena poco central y las nervaduras poco acentuadas, sanas, de color amarillo limón o naranja</p> <p>Presentación: en fardos homogéneos provisionales de 35 a 45 kg de hojas sueltas y separadas por pisos foliares</p> <p>Humedad: 16 %</p>
32	Burley ESP	<p>Hojas de clase 1</p> <p>Clase 1: hojas de suficiente madurez, sin defecto de curado, de textura abierta, con vena central y secundarias poco acentuadas, sanas, de color canela en sus diferentes tonos</p> <p>Presentación: en fardos homogéneos de 35 a 45 kg de hojas sueltas y separadas por pisos foliares</p> <p>Humedad: 18 %</p>

Número de orden	Variedad	Calidad de referencia
33	Virginia PORT	<p>Hojas de clase 1</p> <p>Clase 1: hojas maduras, de textura abierta y elástica, de color brillante, de longitud superior a 40 cm, el primer y el último pisos foliares no incluidos</p> <p>Presentación: en fardos provisionales de 35 kg con las hojas ordenadas</p> <p>Humedad: 17%</p>
34	Burley PORT	<p>Hojas de clase 1</p> <p>Clase 1: hojas maduras, textura abierta y elástica, color brillante, longitud superior a 40 cm, el primer y último pisos foliares no incluidos</p> <p>Presentación: en fardos provisionales de 35 kg con las hojas ordenadas</p> <p>Humedad: 20%</p>

## ANEXO II

## Tabaco embalado: variedades y calidades de referencia del mismo para la cosecha de 1986

Número de orden	Variedad	Calidad de referencia
1	Badischer Geudertheimer y sus híbridos	<p>Hauptgut (Leaves) de la clase 1</p> <p>Clase 1: hojas maduras, sanas, intactas, de color ligeramente moteado a marrón oscuro, de longitud uniforme, normalmente fermentadas</p> <p>Presentación: en fardos, en cajas o en cartones de 75 a 200 kg aproximadamente o en barricas de 225 a 450 kg aproximadamente</p> <p>Humedad: 16 %</p>
2	Badischer Burley E y sus híbridos	<p>Hauptgut (Leaves) de la clase 1</p> <p>Clase 1: hojas maduras, sanas, intactas, carnosas, de color marrón claro, marrón rojizo a marrón oscuro, de longitud uniforme, normalmente fermentadas</p> <p>Presentación: en fardos o cajas de 75 a 175 kg aproximadamente o en barricas de 225 a 450 kg aproximadamente</p> <p>Humedad: 15 %</p>
3	Virgin D	<p>Hojas de la clase 1</p> <p>Clase 1: hojas maduras, sanas, intactas, de color amarillo, rojo amarillo a amarillo parduzco, normalmente fermentadas</p> <p>Presentación: en fardos o en cajas de 75 a 175 kg aproximadamente o en barricas de 225 a 450 kg aproximadamente</p> <p>Humedad: 13 %</p>
7	Bright	<p>Hojas de categoría A</p> <p>Categoría A: hojas de madurez suficiente, sin defectos de manipulación, de textura abierta, con los nervios centrales y los nervios no demasiado acentuados, sanas, de color amarillo en sus diferentes gradaciones</p> <p>Presentación: en barricas de 280 a 450 kg aproximadamente o en cartones de 150 a 210 kg aproximadamente</p> <p>Humedad: 13 %</p>
8	Burley I	<p>Hojas de categoría A</p> <p>Categoría A: hojas de madurez suficiente, sin defectos de manipulación, de textura abierta, incluso consistentes, con los nervios centrales y los nervios no demasiado acentuados, de color avellana más o menos vivo</p> <p>Presentación: en barricas de 280 a 450 kg aproximadamente o en cartones de 150 a 210 kg aproximadamente</p> <p>Humedad: 13 %</p>

Número de orden	Variedad	Calidad de referencia
9	Maryland	<p>Hojas de categoría A</p> <p>Categoría A: hojas de madurez suficiente, que presenten ligeros defectos de curado, incluso con muy poca tonalidad color avellana, de tejido de textura media con los nervios centrales y los nervios no demasiado acentuados, sanas, de coloración marrón rojiza más o menos viva</p> <p>Presentación: en barricas de 280 a 450 kg aproximadamente o en cartones de 150 a 210 kg aproximadamente</p> <p>Humedad: 13 %</p>
10	a) Kentucky y sus híbridos b) Moro di Cori c) Salento	<p>Hojas de categoría B</p> <p>Categoría B: hojas de buena madurez, de tejido consistente, sin defectos de curado y de conservación, de color marrón, que presenten algunos defectos de integridad, de buena combustibilidad</p> <p>Presentación: en barricas de 280 a 450 kg aproximadamente o en fardos de 170 a 200 kg aproximadamente o en cartones de 150 a 200 kg</p> <p>Humedad: 16 %</p>
11	a) Forchheimer Havana II c b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano	<p>Hojas de categoría B</p> <p>Categoría B: hojas de tejido consistente o ligero, sanas, sin defectos de curado, de color marrón a verdoso, que presenten defectos de integridad</p> <p>Presentación: en fardos, cajas o cartones de 75 a 200 kg aproximadamente o en barricas de 225 a 450 kg aproximadamente</p> <p>Humedad: 16 %</p>
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio y variedades similares	<p>Hojas de categoría B</p> <p>Categoría B: hojas de madurez suficiente, de tejido consistente o incluso grueso o fino, que presenten defectos de manipulación, de fermentación y de integridad no demasiado acentuados</p> <p>Presentación: en fardos de 120 kg aproximadamente o en barricas de 330 kg aproximadamente</p> <p>Humedad: 16 %</p>
13	Xanti-Yakà	<p>Hojas de categoría B</p> <p>Categoría B: hojas suficientemente sanas y maduras, sésiles, de forma oval elíptica, con los nervios centrales poco acentuados y los nervios secundarios de ángulo más bien abierto, que puedan presentar algunos defectos de curado, de tejido ligero la mayoría de las veces, de color que va del amarillo al marrón, con marcados defectos de integridad, pero bien conservadas, procedentes de todos los pisos foliares, de gusto discreto, de aroma suficiente y de buena combustibilidad</p> <p>La longitud de las hojas medianas no supera los 20 cm</p> <p>Presentación: fardos pequeños de 18 a 50 kg aproximadamente</p> <p>Humedad: 13 %</p>

Número de orden	Variedad	Calidad de referencia						
14	a) Perustitza b) Samsun	<p>Hojas de categoría B</p> <p>Categoría B: hojas suficientemente sanas y maduras, sésiles (Perustitza) o pecioladas (Samsun), de forma elíptica lanceolada con la punta afilada (Perustitza) o elíptica redondeada (Samsun), con los nervios centrales poco acentuados y los nervios secundarios con un ángulo tendente al agudo, que puedan presentar algunos defectos de curado, de tejido la mayoría de las veces ligero, de color que va del amarillo al marrón (Perustitza) o tendente al rojizo (Samsun), con marcados defectos de integridad, pero bien conservadas, procedentes de todos los pisos foliares, de gusto discreto, de aroma suficiente y de buena combustibilidad</p> <p>La longitud de las hojas medianas no supera los 25 cm</p> <p>Presentación: fardos pequeños de 18 a 50 kg aproximadamente</p> <p>Humedad: 13 %</p>						
15	Erzegovina y variedades similares	<p>Hojas de categoría B</p> <p>Categoría B: hojas suficientemente sanas y maduras, sésiles, de forma oval o elíptica, con los nervios centrales medianamente acentuados y los nervios secundarios en ángulo más bien abierto, que puedan presentar algunos defectos de curado, de tejido la mayoría de las veces ligero, de color que va del amarillo al marrón, con marcados defectos de integridad, pero bien conservadas, procedentes de todos los pisos foliares, de gusto discreto, de aroma suficiente y de buena combustibilidad</p> <p>La longitud de las hojas medianas no supera los 35 cm</p> <p>Presentación: fardos pequeños de 18 a 50 kg aproximadamente</p> <p>Humedad: 13 %</p>						
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	<p>Hojas de categoría B</p> <p>Categoría B: hojas medianas inferiores seleccionadas por longitud de acuerdo con las proporciones siguientes:</p> <table data-bbox="869 1395 1477 1496"> <tr> <td>1ª longitud (igual o superior a 38 cm)</td> <td>60 %</td> </tr> <tr> <td>2ª longitud (de 32 a menos de 38 cm)</td> <td>35 %</td> </tr> <tr> <td>3ª longitud (de 25 a 32 cm)</td> <td>5 %</td> </tr> </table> <p>Hojas de dimensión conveniente, de buena madurez y de color uniforme, sanas, sin defectos de integridad, de textura fina, elástica y resistente, con los nervios centrales y los nervios poco pronunciados, de buena fermentación y bien conservadas, de buena combustibilidad, de gusto y aroma típicos, utilizables para el encapado de cigarrillos, que incluyan aproximadamente un 25 % de hojas no íntegras</p> <p>Presentación: en fardos de 70 a 90 kg aproximadamente o en cartones de 180 a 210 kg aproximadamente</p> <p>Humedad: 16 %</p>	1ª longitud (igual o superior a 38 cm)	60 %	2ª longitud (de 32 a menos de 38 cm)	35 %	3ª longitud (de 25 a 32 cm)	5 %
1ª longitud (igual o superior a 38 cm)	60 %							
2ª longitud (de 32 a menos de 38 cm)	35 %							
3ª longitud (de 25 a 32 cm)	5 %							
17	Basmas	<p>Hojas de la calidad I/III</p> <p>Calidad I/III: hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción del primero (protomana), que tengan hasta 15 cm de longitud, de color amarillo oro, anaranjado a rojo amarillo, de buena elasticidad y brillantes, bastante carnosas, estructura floja y buena textura, de aroma típico y acusado, de buena combustibilidad</p>						

Número de orden	Variedad	Calidad de referencia
17 (cont.)	Basmas	<p>Las hojas anteriormente descritas (I/II) constituirán el 45 % de la calidad I/III</p> <p>Hojas maduras y suficientemente íntegras, que presenten unos ligeros defectos de curado, algunas señales de enfermedad, que tengan hasta 20 cm de longitud, de color amarillo claro, rojizo o marrón claro, de estructura bastante floja y de buena textura, de elasticidad y brillo medios, moderadamente carnosas, de aroma típico y acusado, de muy buena combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas (III) constituirán el 55 % de la calidad I/III</p> <p>Presentación: en fardos llamados «Tongas» de 30 kg aproximadamente</p> <p>Humedad: 13 %</p>
18	Katerini y variedades similares	<p>Hojas de la calidad I/III</p> <p>Calidad I/III: hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción del primero (protomana), que tengan hasta 20 cm de longitud, de color amarillo claro o anaranjado a rojizo, de estructura floja, de buena elasticidad, brillantes, bastante carnosas, de buena textura y muy buena combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas I/II constituirán el 45 % de la calidad I/III</p> <p>Hojas maduras, que presenten unos ligeros defectos de integridad y de curado, algunas señales de enfermedad, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 25 cm de longitud, de color amarillo, anaranjado, verde amarillo, rojizo o marrón claro, de estructura floja, de elasticidad media y brillantes, bastante carnosas, de buena textura y de muy buena combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas constituirán el 55 % de la calidad I/III</p> <p>Presentación: en fardos llamados «Tongas» de 30 kg cada uno aproximadamente</p> <p>Humedad: 13 %</p>
19	a) Kaba Koulak clásico b) Ellassona	<p>Hojas de la calidad I/III</p> <p>Calidad I/III: hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción de las hojas de corona, que tengan hasta 25 cm de longitud para Macedonia Kaba Koulak y hasta 20 cm de longitud para Ellassona, Karatzova y Kontoula, de color amarillo medio a oscuro, de buena elasticidad y brillantes, de estructura floja, de buena textura y de excelente combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas constituirán el 47 % de la calidad I/III</p> <p>Hojas maduras, que presenten unos ligeros defectos de integridad y/o curado, algunas señales de enfermedad, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 30 cm de longitud para Macedonia Kaba Koulak y 25 cm de longitud para Ellassona, Karatzova y Kontoula, de color amarillo a rojizo, de estructura bastante floja y de bastante buena textura, de elasticidad media y brillantes, de excelente combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas constituirán el 53 % de la calidad I/III</p> <p>Presentación: en fardos llamados «Tongas» de 30 kg cada uno aproximadamente</p> <p>Humedad: 13 %</p>

Número de orden	Variedad	Calidad de referencia
20	a) Kaba Koulak no clásico b) Myrodata Smyrne, Trapezous y Phi I	<p>Hojas de la calidad I/III</p> <p>Calidad I/III: hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción de las hojas de corona, que tengan hasta 30 cm de longitud para Macedonia Kaba Koulak y Trapezous, hasta 20 cm para Phi I y hasta 15 cm para Myrodata Smyrne, de color amarillo claro a rojizo, de buena elasticidad y brillantes, de estructura bastante floja, de buena textura y excelente combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas (I/II) constituirán el 47 % de la calidad I/III</p> <p>Hojas maduras y suficientemente íntegras, que presenten ligeros defectos de curado, algunas señales de enfermedad, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 35 cm de longitud para Kaba Koulak Macedonia y Trapezous, hasta 25 cm para Phi I y hasta 20 cm para Myrodata Smyrne, de color amarillo a marrón claro, de estructura bastante floja, de bastante buena textura, bastante elásticas y brillantes, de muy buena combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas (III) constituirán el 53 % de la calidad I/III</p> <p>Presentación: en fardos llamados «Tongas» de 30 kg cada uno aproximadamente</p> <p>Humedad: 13 %</p>
21	Myrodata Agrinion	<p>Hojas de la calidad I/III</p> <p>Calidad I/III: hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción del primero (protomana), que tengan hasta 25 cm de longitud, de color amarillo a anaranjado oscuro, de buena elasticidad y brillantes, de estructura floja, de buena textura y de excelente combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas (I/II) constituirán el 47 % de la calidad I/III</p> <p>Hojas maduras suficientemente íntegras, que presenten ligeros defectos de secado, algunas señales de enfermedad, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 30 cm de longitud, de color amarillo a rojizo claro, de estructura bastante floja y de bastante buena textura, bastante elásticas y brillantes, de excelente combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas (III) constituirán el 53 % de la calidad I/III</p> <p>Presentación: en fardos llamados «Tongas» de 30 kg aproximadamente</p> <p>Humedad: 14 %</p>
22	Zichnomyrodata	<p>Hojas de la calidad I/III</p> <p>Calidad I/III: hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción de las hojas de corona, que tengan hasta 20 cm de longitud, de color amarillo claro a naranja claro, de buena elasticidad y brillantes, de estructura floja, de buena textura y de excelente combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas constituirán el 47 % de la calidad I/III</p> <p>Hojas maduras y suficientemente íntegras, que presenten ligeros defectos de curado, algunas señales de enfermedad, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 25 cm de longitud, de color amarillo a rojizo claro, de estructura bastante floja y de bastante buena textura, bastante elásticas y brillantes, de excelente combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas (III) constituirán el 53 % de la calidad I/III</p> <p>Presentación: en fardos llamados «Tongas» de 30 kg aproximadamente</p> <p>Humedad: 13 %</p>

Número de orden	Variedad	Calidad de referencia
23	Tsebelia	<p>Hojas de la calidad I/III</p> <p>Calidad I/III: hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción del primero (protomana), que tengan hasta 30 cm de longitud, de color rojo amarillo, naranja a rojizo, de estructura floja, elásticas y brillantes, bastante carnosas, de buena textura y de muy buena combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas I/II constituirán el 45 % de la calidad I/III</p> <p>Hojas maduras y suficientemente íntegras, que presenten ligeros defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 40 cm de longitud, de color amarillo claro a rojizo o marrón claro, de estructura bastante floja, bastante elásticas y bastante brillantes, bastante carnosas, de bastante buena textura y de muy buena combustibilidad. Esta categoría también comprende las hojas ligeramente desecadas por enfermedades y/o que presenten ligeros defectos de integridad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas constituirán el 55 % de la calidad I/III</p> <p>Presentación: en fardos llamados «Tongas» de 30 kg aproximadamente</p> <p>Humedad: 13 %</p>
24	Mavra	<p>Hojas de la calidad I/III</p> <p>Calidad I/III: hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con excepción del primero (protomana), que tengan hasta 30 cm de longitud, de un color que va del rojo amarillo o naranja al rojizo, de estructura floja, de buena de textura, elásticas y brillantes, bastante carnosas, de buena combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas constituirán el 45 % de la calidad I/III</p> <p>Hojas maduras y suficientemente íntegras, que presenten ligeros defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 40 cm de longitud, de color amarillento a rojizo o marrón claro, de estructura bastante floja y de bastante buena textura, bastante elásticas y brillantes, bastante carnosas y de buena combustibilidad. Esta categoría también comprende las hojas ligeramente desecadas por las enfermedades y/o que presenten ligeros defectos de integridad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas constituirán el 55 % de la calidad I/III</p> <p>Presentación: en fardos llamados «Tongas» de 30 kg aproximadamente</p> <p>Humedad: 13 %</p>
25	Burley GR	<p>Hojas de la calidad A</p> <p>Calidad A: hojas completamente maduras, completamente desarrolladas, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes del piso medio, de color uniforme que va del marrón avellana medio al rojo avellana medio, de estructura floja, de buena textura y de excelente combustibilidad</p> <p>Presentación: en fardos de 100 kg aproximadamente o en cajas de 200 kg aproximadamente o en barricas de 240 a 280 kg aproximadamente</p> <p>Humedad: 13 %</p>
26	Virginia GR	<p>Hojas de la calidad A</p> <p>Calidad A: hojas completamente maduras, completamente desarrolladas, procedentes del piso medio, sanas, íntegras, sin defectos de curado, de color amarillo uniforme que va del amarillo limón al naranja medio, de buena textura y de buena combustibilidad</p> <p>Presentación: en fardos de 100 kg aproximadamente</p> <p>Humedad: 13 %</p>

Número de orden	Variedad	Calidad de referencia
27	Santa Fe	<p>Hojas de clase 1</p> <p>Clase 1: hojas maduras, sanas, bien fermentadas, color marrón o marrón oscuro, con algunos defectos de integridad</p> <p>Presentación: en fardos de 80 a 100 kg o en cajas de cartón de 150 a 210 kg</p> <p>Humedad: 14 %</p>
28	Burley fermentado	<p>Hojas de clase 1</p> <p>Clase 1: hojas maduras, sanas, bien fermentadas y color marrón, con algunos defectos de integridad</p> <p>Presentación: en fardos de 80 a 100 kg o en cajas de cartón de 150 a 210 kg</p> <p>Humedad: 14 %</p>
29	Havana ESP	<p>Hojas de clase 1</p> <p>Clase 1: hojas maduras, sanas, de textura fina, con la vena central y las nervaduras no muy acentuadas, bien fermentadas, de color marrón, marrón claro o de tonos verdosos, con algún defecto de integridad</p> <p>Presentación: en fardos de 80 a 100 kg o en cartones de 150 a 210 kg</p> <p>Humedad: 14 %</p>
30	Round Scafati	<p>Hojas de clase 1</p> <p>Clase 1: hojas de dimensión suficiente, de buena madurez, de color uniforme, sanas, sin defectos importantes de integridad, de textura fina, elásticas y resistentes, con la vena central y las nervaduras finas, bien conservadas, de buena combustibilidad, de gusto y aroma típicos, bien fermentadas, utilizables para capas de cigarrillos. Se puede tolerar un porcentaje de hojas no íntegras del 25 % aproximadamente</p> <p>Presentación: en fardos de 70 a 100 kg o en cartones de 180 a 210 kg</p> <p>Humedad: 14 %</p>
31	Virginia ESP	<p>Hojas de clase 1</p> <p>Clase 1: hojas de madurez suficiente, de textura abierta, con la vena central y las nervaduras poco acentuadas, sanas, de color amarillo con diferentes tonos, desde el amarillo limón al naranja</p> <p>Presentación: en cartones de 170 a 210 kg</p> <p>Humedad: 14 %</p>
32	Burley ESP	<p>Hojas de clase 1</p> <p>Clase 1: hojas de madurez suficiente, de textura abierta, con la vena central y las nervaduras poco acentuadas, sanas, de color canela en sus diferentes tonos</p> <p>Presentación: en cartones de 150 a 210 kg</p> <p>Humedad: 14 %</p>

Número de orden	Variedad	Calidad de referencia
33	Virginia PORT	<p>Hojas de clase 1</p> <p>Clase 1: hojas maduras, sin defectos de manipulación, de textura abierta y elástica, aceitosas, de color amarillo limón o naranja, brillante, longitud superior a 40 cm, el primer y el último pisos foliculares no incluidos</p> <p>Presentación: en cartones de hojas sueltas de 200 kg</p> <p>Humedad: 12,5 %</p>
34	Burley PORT	<p>Hojas de clase 1</p> <p>Clase 1: hojas maduras, sin defectos de manipulación, de textura abierta y elástica, color brillante, longitud superior a 40 cm, el primer y el último pisos foliculares no incluidos</p> <p>Presentación: en cartones de hojas sueltas de 180 kg</p> <p>Humedad: 13 %</p>

## ANEXO III

## Zonas de cultivo reconocidas para cada una de las variedades de tabaco de la producción comunitaria

Variedad	País	Zonas de producción
1. Badischer Geudertheimer y sus híbridos	RFA Francia Italia	Planicie renana y valles adyacentes, Franconia Media Norte, Pas-de-Calais, Picardía, Champagne-Ardenas, Alsacia-Lorena, Valle del Loira y Poitou-Breñaña Venecia, Toscana, Molise, Campania y Lacio
2. Badischer Burley E y sus híbridos	RFA Francia Italia	Planicie renana y valles adyacentes de Franconia Media Aquitania, Mediodía-Pirineos, Auvernia-Lemosín, Alsacia-Lorena, Ródano-Alpes, Franco-Condado, Valle del Loira, Centro, Poitou-Breñaña, Borgoña y Charente Piemonte, Lombardía, Véneto
3. Virgin D	RFA Francia	Schleswig-Holstein, Baja-Sajonia, Franconia y planicie renana Aquitania, Mediodía-Pirineos, Auvernia-Lemosín, Champagne-Ardenas, Alsacia-Lorena, Ródano-Alpes, Franco-Condado, Provenza, Valle del Loira, Centro, Poitou Breñaña, Languedoc-Rosellón, Normandía, Borgoña, Charente, Norte-Pas-de-Calais, Picardía
4. a) Paraguay y sus híbridos b) Dragón verde y sus híbridos, Phillippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	Francia Italia Bélgica	Aquitania, Mediodía-Pirineos, Languedoc-Rosellón, Auvernia-Lemosín, Poitou-Breñaña, Valle del Loira, Centro, Ródano-Alpes, Provenza, Franco-Condado, Alsacia-Lorena, Champagne-Ardenas, Picardía, Norte-Pas-de-Calais, Normandía y Borgoña Molise y Campania
5. Nijkerk	Francia	Departamentos de Lot y Aveyron
6. Misionero	Francia	Isla de la Reunión
7. Bright	Italia	Friul, Véneto, Lombardía, Piamonte, Toscana, Marcas, Umbrias, Lacio, Abruzos, Molise, Campania, Basilicata, Apulias y Calabria-Calabria
8. Burley I	Italia	Véneto, Lombardía, Piamonte, Umbría, Emilia-Romaña, Lacio, Abruzos, Molise, Campania, Basilicata, Apulias y Sicilia
9. Maryland	Italia	Friul, Lombardía, Toscana, Marcas, Umbría, Lacio, Molise y Campania
10. Kentucky	Italia	Toscana, Umbría, Lacio, Campania, Véneto
11. F. Havanna	Italia	Friul, Trento, Véneto, Toscana, Lacio, Molise y Campania
12. Beneventano Brasile selvaggio	Italia	Campania Sicilia
13. Xanti-Yakà	Italia	Abruzos, Campania, Basilicata y Apulias
14. a) Perustitza b) Samsun	Italia	Lacio, Abruzos, Molise, Campania, Apulias y Sicilia
15. Erzegovina	Italia	Lacio, Abruzos y Apulias

Variedad	País	Zonas de producción
16. Round Tip	Grecia Italia	Macedonia central Campania
17. Basma	Grecia	Tracia, Macedonia, Sterea Hellas
18. Katerini	Grecia	Macedonia
19. a) Kaba Koulak Clásico	Grecia	Macedonia
20. b) Elassona	Grecia	Tesalia
21. Kaba Koulak no Clásico	Grecia	Macedonia, Tesalia, Sterea Hellas, Tracia, Epiro, Peloponeso y las islas
22. Myrodata Agrinion	Grecia	Sterea Hellas
23. Zichnomyrodata	Grecia	Tesalia
24. Tsebelia	Grecia	Epiro y Sterea Hellas
25. Mavra	Grecia	Tesalia, Peloponeso y Sterea Hellas
26. Burley GR	Grecia	Macedonia, Tesalia
27. Virgin GR	Grecia	Sterea Hellas, Tesalia, Macedonia, Tracia, Peloponeso
28. Santa Fe	España	Andalucía
29. Burley Ferm.	España	Extremadura, Andalucía, Castilla y León, Castilla La-Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra, La Rioja, Cataluña, Madrid
30. Havana ESP	España	Castilla y León, Navarra, Galicia, Asturias, Cantabria
31. Round Scafati	España	Galicia, Asturias, Navarra, Castilla y León, Cantabria
32. Virginia ESP	España	Extremadura, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha
33. Burley ESP	España	Extremadura, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha
34. Virginia PORT	Portugal	Beira Interior, Ribatejo Oeste, Alentejo, Região Autónoma dos Açores
35. Burley PORT	Portugal	Beiras, Ribatejo Oeste, Entre Douro e Minho, Tras-os-Montes, Região Autónoma dos Açores

## ANEXO IV

## Precios de objetivo, precios de intervención y primas para los tabacos en hoja de la cosecha 1985

## Precios de intervención derivados para los tabacos embalados de la cosecha 1985

(en ECUS/kg)

Número de orden	Variedades	Precios de objetivo	Precios de intervención	Importe de la prima	Precios de intervención derivados
1	Badischer Geudertheimer y sus híbridos	3,572	3,036	2,484	4,570
2	Badischer Burley E y sus híbridos	4,512	3,835	2,847	5,426
3	Virgin D	4,491	3,817	2,733	5,052
4	a) Paraguay y sus híbridos b) Dragón verde y sus híbridos, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	3,333	2,833	2,306	-
5	Nijkerk	3,291	2,797	2,090	-
6	a) Misionero y sus híbridos b) Río Grande y sus híbridos	3,067	2,607	2,117	-
7	Bright	3,951	3,358	2,298	4,650
8	Burley I	2,848	2,421	1,589	3,565
9	Maryland	3,313	2,816	1,802	4,014
10	a) Kentucky b) Moro di Cori c) Salento	2,741	2,330	1,730	3,294
11	a) Forchheimer Havana II c b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano	3,130	2,661	2,161	4,053
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio y variedades similares	1,690	1,437	1,220	2,232
13	Xanti-Yakà	3,465	2,945	2,552	4,725
14	a) Perustitza b) Samsun	3,280	2,788	2,429 2,364	4,116 4,140
15	Erzegovina y variedades similares	2,947	2,505	2,188	3,712
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	15,596	13,257	9,420	20,478
17	Basmas	5,913	5,026	2,869	6,747
18	Katerini y variedades similares	4,925	4,186	2,552	6,050
19	a) Kaba Koulak clásico b) Elassona	4,279	3,637	2,211	5,170
20	a) Kaba Koulak no clásico b) Myrodata Smyrne, Trapezous y Phi 1	3,223	2,740	1,514	4,163
21	Myrodata Agrinion	4,253	3,615	2,233	5,080
22	Zichnomyrodata	4,419	3,756	2,355	5,303
23	Tsebelia	3,695	3,141	2,936	4,613

Número de orden	Variedades	Precios de objetivo	Precios de intervención	Importe de la prima	Precios de intervención derivados
24	Mavra	3,607	3,066	2,400	4,529
25	Burley GR	2,251	1,913	0,953	3,034
26	Virginia GR	3,695	3,141	2,936	4,359
27	Santa Fe	1,356	1,153	0,295	2,007
28	Burley P Ferm.	2,196	1,867	0,904	2,878
29	Havana ESP	2,822	2,399	1,914	3,575
30	Round Scafati	8,499	7,224	5,795	12,436
31	Virginia ESP	4,399	3,739	2,198	5,176
32	Burley ESP	2,965	2,520	1,344	3,789
33	Virginia PORT	4,139	3,518	2,198	4,834
34	Burley PORT	3,072	2,611	1,344	3,896